

Medicinas: Clozapina

Dirección de esta página: <http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/druginfo/medmaster/a691001-es.html>

Nombre(s) comercial(es): Clozaril

Advertencia:

La clozapina puede causar una grave afección sanguínea. Cumpla con todas las citas con su doctor y el laboratorio. Antes de comenzar el tratamiento su doctor ordenará ciertas pruebas de laboratorio 1 vez a la semana durante los 6 primeros meses y posteriormente por lo menos 1 vez en semanas alternas para comprobar su respuesta a la clozapina. La clozapina puede causar crisis convulsivas. Dígale a su doctor si tiene o alguna vez ha tenido crisis convulsivas. No conduzca automóviles, no opere maquinarias, ni practique natación o escale a las alturas mientras toma clozapina, porque si usted repentinamente pierde la conciencia podría resultar lesionado o lesionar a otras personas. La clozapina puede causar inflamación (hinchazón) del músculo del corazón, una condición llamada miocarditis que puede ser peligrosa. Si usted experimenta alguno de los siguientes síntomas, llame a su doctor de inmediato: cansancio extremo; dificultad para respirar o agitación; fiebre; dolor en el pecho; frecuencia cardíaca irregular o más rápida que lo usual. La clozapina puede causar una baja en la presión arterial y/o mareos cuando usted se pone de pie, especialmente cuando recién ha comenzado a tomarla. Dígale a su doctor si usted está tomando medicamentos para la ansiedad (ansiolíticos) como diazepam (Valium), pastillas para dormir o medicamentos de otro tipo para la esquizofrenia. Siga las indicaciones de su doctor acerca de comenzar a tomar una dosis baja de clozapina y aumentar gradualmente la dosis. Si usted deja de tomar clozapina durante 2 días o más, converse con su doctor acerca de cómo volver a comenzar con la clozapina a una dosis baja.

¿Para cuáles condiciones o enfermedades se prescribe este medicamento?

La clozapina se usa para tratar la esquizofrenia en los pacientes cuando otros medicamentos no han funcionado. La clozapina pertenece a una clase de medicamentos llamados antipsicóticos. Funciona al reducir la excitación anormal en el cerebro.

¿Cómo se debe usar este medicamento?

La clozapina viene envasada en forma de tabletas para tomar por vía oral. Por lo general se toma 3 veces al día. Siga cuidadosamente las instrucciones en la etiqueta del medicamento y pregúntele a su doctor o farmacéutico cualquier cosa que no entienda. Use el medicamento exactamente como se indica. No use más ni menos que la dosis indicada ni tampoco más seguido que lo prescrito por su doctor.

La cantidad de clozapina que usted toma podría tener que ser ajustada, especialmente durante las primeras semanas. Usted tendrá análisis de sangre semanales mientras toma clozapina y durante 4 semanas después que ha dejado de tomarla. Inicialmente, usted recibirá a la vez sólo un suministro de 1 semana de este medicamento.

Siga tomando el medicamento aunque se sienta mejor y no deje de tomarlo sin antes consultarlo con su médico, especialmente si usted ha estado tomando dosis grandes durante mucho tiempo. Su doctor probablemente querrá reducir su dosis gradualmente. Este medicamento debe tomarse regularmente durante unas pocas semanas antes de que se sienta su efecto total.

¿Qué otro uso se le da a este medicamento?

Este medicamento no debería ser prescrito para otros usos; pídale más información a su doctor o farmacéutico.

¿Cuáles son las precauciones especiales que debo seguir?

Antes de comenzar a tomar clozapina:

- díglele a su doctor y a su farmacéutico si es alérgico a la clozapina o a otros medicamentos.
- díglele a su doctor y a su farmacéutico qué otros medicamentos con o sin prescripción está tomando, especialmente aquellos enumerados en la sección ADVERTENCIA, los anticoagulantes como warfarina (Cumadina), benztropina (Cogentin), carbamazepina (Tegretol), cimetidina (Tagamet), dicitilomino (Bentyl), eritromicina (E.E.S., E-Mycin, otros), medicamentos para la hipertensión, fenitoína (Dilantin), analgésicos como la codeína, inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina (ISRS) como fluoxetina (Prozac, Sarafem) y fluvoxamina (Luvox), trihexifenidilo (Artane) y vitaminas.
- además de las condiciones enumeradas en la sección ADVERTENCIA, díglele a su doctor si tiene o alguna vez ha tenido trastornos sanguíneos; enfermedades al corazón, riñón, o al hígado; depresión; epilepsia; problemas con su sistema urinario o la próstata; glaucoma; frecuencia cardíaca irregular; problemas con su presión arterial; o problemas sanguíneos causados por la clozapina.
- díglele a su doctor si está embarazada, tiene planes de quedar embarazada o si está amamantando. Si queda embarazada mientras toma este medicamento, llame a su doctor de inmediato.
- si va a ser sometido a cualquier cirugía, incluyendo la dental, díglele al doctor o dentista que usted está tomando clozapina.
- usted debe saber que este medicamento puede provocar somnolencia (sueño).
- recuerde que el alcohol puede aumentar la somnolencia provocada por este medicamento.
- díglele a su doctor si usted usa productos derivados del tabaco. Fumar puede reducir la eficacia de este medicamento.

¿Qué tengo que hacer si me olvido de tomar una dosis?

Si usted toma clozapina varias veces al día, tome la dosis perdida tan pronto como lo recuerde y tome cualquier dosis restante durante ese día a intervalos espaciados por igual período de tiempo. Sin embargo, si es hora para la siguiente, sátese aquella que no tomó y siga con la dosificación regular. No tome una dosis doble para compensar la que olvidó.

Si usted toma clozapina 1 vez al día a la hora de acostarse y se olvida de tomarla hasta la próxima mañana, sátese la dosis perdida. No tome una dosis doble para compensar la que olvidó.

¿Cuáles son los efectos secundarios que podría provocar este medicamento?

Aunque los efectos secundarios de este medicamento no son comunes, podrían llegar a presentarse. Díglele a su doctor si cualquiera de estos síntomas se vuelve severo o si no desaparece:

- somnolencia (sueño)
- sensación de sequedad en la boca
- diarrea
- estreñimiento
- agitación
- cefalea (dolor de cabeza)

Si usted experimenta alguno de los siguientes síntomas o aquellos enumerados en la sección ADVERTENCIA, llame a su doctor de inmediato:

- estremecimientos
- crisis convulsivas o convulsiones
- dificultad para orinar o pérdida de control de la vejiga
- confusión
- dolor de los ojos
- temblores

- dolor en el pecho
- calambres musculares severos
- dolor de garganta
- sangrado inusual o facilidad para desarrollar moretones
- malestar estomacal
- vómitos
- pérdida del apetito
- coloración amarillenta de la piel o los ojos

La clozapina puede causar un aumento del nivel de azúcar en la sangre (hiperglucemia). Si usted experimenta cualquiera de los siguientes síntomas, llame a su doctor de inmediato:

- sed
- sensación de sequedad en la boca
- cansancio
- sofocación
- piel seca
- necesidad de orinar con mayor frecuencia
- pérdida del apetito
- dificultad para respirar

¿Cómo debo almacenar este medicamento?

Mantenga este medicamento en su envase, bien cerrado y fuera del alcance de los niños. Almacénelo a temperatura ambiente y lejos del calor excesivo y la humedad (no en el baño). Deseche cualquier medicamento que esté vencido o que ya no se utilice. Converse con su farmacéutico acerca del desecho adecuado de los medicamentos.

¿Qué debo hacer en caso de una sobredosis?

En caso de una sobredosis, llame a la oficina local de control de envenenamiento al 1-800-222-1222. Si la víctima está inconsciente, o no respira, llame inmediatamente al 911.

¿Qué otra información de importancia debería saber?

No deje que otras personas tomen su medicamento. Pregúntele al farmacéutico cualquier duda que tenga sobre cómo renovar la prescripción de su medicamento.

Documento actualizado - 01/04/2003



American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Cláusula de Protección -

<http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ashpdisclaimer.html>

Copyright, 2003, American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Todos los derechos reservados. Su duplicación para uso comercial deberá ser autorizada por ASHP. Traducido del inglés por GraciasDoctor, Inc.