

Medicinas: Venlafaxina

Dirección de esta página: <http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/druginfo/medmaster/a694020-es.html>
Nombre(s) comercial(es): Effexor

Advertencia:

Antes de comenzar a tomar venlafaxina, dígame a su doctor si usted está tomando o ha tomado en las últimas 2 semanas cualquier inhibidor de MAO [fenelzina (Nardil) o tranilcipromina (Parnate)]. Usted no debe tomar venlafaxina si está tomando cualquiera de estos medicamentos.

¿Para cuáles condiciones o enfermedades se prescribe este medicamento?

La venlafaxina es un antidepresivo que se usa para tratar la depresión. Este medicamento también puede ser prescrito para otros usos; pídale más información a su doctor o farmacéutico.

¿Cómo se debe usar este medicamento?

La venlafaxina viene envasada en forma de tabletas para tomar por vía oral. Generalmente se toma dos o tres veces al día, con alimentos. Siga cuidadosamente las instrucciones en la etiqueta del medicamento y pregúntele a su doctor o farmacéutico cualquier cosa que no entienda. Use el medicamento exactamente como se indica. No use más ni menos que la dosis indicada ni tampoco más seguido que lo prescrito por su doctor. Siga tomando este medicamento aunque se sienta bien y no descontinúe su uso sin antes conversar con su doctor, especialmente si usted ha tomado dosis grandes durante mucho tiempo. Su doctor probablemente reducirá la dosis en forma gradual. Este medicamento debe tomarse regularmente durante algunas semanas antes de que se sienta su efecto total.

¿Cuáles son las precauciones especiales que debo seguir?

Antes de comenzar a tomar venlafaxina:

- dígame a su doctor y a su farmacéutico si usted es alérgico a la venlafaxina o a otros medicamentos.
- además de los medicamentos enumerados en la sección de ADVERTENCIAS, dígame a su doctor y a su farmacéutico qué otros medicamentos con y sin prescripción está tomando, especialmente anticoagulantes [warfarina (Cumadina)]; cimetidina (Tagamet); indinavir (Crixivan); litio (Eskalith, Lithobid), medicamentos para la hipertensión; relajantes musculares; sedantes; pastillas para dormir; tranquilizantes; y vitaminas.
- dígame a su doctor si tiene o alguna vez ha tenido dificultad para orinar, presión intraocular elevada, o problemas al hígado, riñón o al corazón.
- dígame a su doctor si está embarazada, tiene planes de quedar embarazada o si está amamantando. Si queda embarazada mientras toma este medicamento, llame a su doctor de inmediato.
- si va a ser sometido a cualquier cirugía, incluyendo la dental, dígame al doctor o dentista que usted está tomando venlafaxina.
- este medicamento puede provocar somnolencia (darle sueño). No conduzca automóviles ni maneje maquinaria pesada hasta que sepa cómo lo afectará este medicamento.
- el alcohol puede aumentar la somnolencia provocada por este medicamento.

¿Qué tengo que hacer si me olvido de tomar una dosis?

Si usted toma varias dosis al día, tome la que olvidó tan pronto como lo recuerde y tome las restantes para ese día a intervalos iguales de tiempo. Sin embargo, si es hora para la siguiente, sátese aquella que no tomó y siga con la dosificación regular. No tome una dosis doble para compensar la que olvidó.

Si usted toma venlafaxina una vez al día a la hora de acostarse y no se acuerda de tomarla hasta la mañana siguiente, sátese la dosis que olvidó. No tome una dosis doble para compensar la que olvidó.

¿Cuáles son los efectos secundarios que podría provocar este medicamento?

Los efectos secundarios de este medicamento son comunes:

- malestar estomacal
- somnolencia (sueño)
- debilidad o cansancio
- excitación o ansiedad
- insomnio
- pesadillas
- sensación de sequedad en la boca
- aumento de la sensibilidad de la piel a la luz solar
- cambios en el apetito o peso
- cefalea (dolor de cabeza)

Dígale a su doctor si cualquiera de estos síntomas se vuelve severo o si no desaparece:

- estreñimiento (constipación)
- dificultad para orinar
- necesidad de orinar con frecuencia
- visión borrosa
- cambios en la capacidad o deseo sexual
- sudoración

Si usted experimenta alguno de los siguientes síntomas, llame a su doctor de inmediato:

- espasmos musculares en la mandíbula, cuello y espalda
- problemas para hablar
- tambaleo al caminar
- temblor fino y persistente o incapacidad para mantenerse sentado
- fiebre
- dificultad para respirar o tragar
- sarpullido severo (erupciones en la piel)
- decoloración amarillenta de la piel u ojos
- frecuencia cardíaca irregular

¿Cómo debo almacenar este medicamento?

Mantenga este medicamento en su envase, bien cerrado y fuera del alcance de los niños. Almacénelo a temperatura ambiente y lejos del calor excesivo y la humedad (no en el baño). Deseche cualquier medicamento que esté vencido o que ya no se utilice. Converse con su farmacéutico acerca del desecho adecuado de los medicamentos.

¿Qué debo hacer en caso de una sobredosis?

En caso de una sobredosis, llame a la oficina local de control de envenenamiento al 1-800-222-1222. Si la víctima está inconsciente, o no respira, llame inmediatamente al 911.

¿Qué otra información de importancia debería saber?

Cumpla con todas las citas con su doctor y el laboratorio. Su doctor podría ordenar algunos exámenes de laboratorio para determinar la respuesta de su cuerpo a la venlafaxina.

No deje que otras personas tomen su medicamento. Pregúntele al farmacéutico cualquier duda que tenga sobre cómo renovar la prescripción de su medicamento.

Documento actualizado - 01/04/2003



American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Cláusula de Protección -

<http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ashpdisclaimer.html>

Copyright, 2003, American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Todos los derechos reservados. Su duplicación para uso comercial deberá ser autorizada por ASHP. Traducido del inglés por GraciasDoctor, Inc.