

Medicinas: Mirtazapina

Dirección de esta página: <http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/druginfo/medmaster/a697009-es.html>

Nombre(s) comercial(es): Remeron; Remeron SolTab

¿Para cuáles condiciones o enfermedades se prescribe este medicamento?

La mirtazapina, un antidepresivo o medicamento para ayudar a levantar el estado de ánimo, se usa para tratar la depresión.

Este medicamento también puede ser prescrito para otros usos; pídale más información a su doctor o farmacéutico.

¿Cómo se debe usar este medicamento?

La mirtazapina viene envasada en forma de tabletas regulares y de desintegración para tomar por vía oral. Por lo general se toma una vez al día a la hora de acostarse. Puede tomarse con o sin alimentos. Siga cuidadosamente las instrucciones en la etiqueta del medicamento y pregúntele a su doctor o farmacéutico cualquier cosa que no entienda. Use el medicamento exactamente como se indica. No use más ni menos que la dosis indicada ni tampoco más seguido que lo prescrito por su doctor.

Para tomar mirtazapina desintegrable, abra el paquete con manos secas y coloque la tableta en su lengua. La tableta se desintegrará en la lengua y puede digerirse con saliva. No se necesita tomar agua para tomar las tabletas desintegrables. Una vez que la tableta se extrae del paquete, no puede volver a almacenarse. No divida `la mirtazapina` que desintegra los comprimidos.

Siga tomando este medicamento aunque se sienta bien y no descontinúe su uso sin antes conversar con su doctor, especialmente si usted ha tomado dosis grandes durante mucho tiempo. Su doctor probablemente reducirá la dosis en forma gradual. Este medicamento debe tomarse regularmente durante algunas semanas antes de que se sienta su efecto total.

¿Cuáles son las precauciones especiales que debo seguir?

Antes de comenzar a tomar mirtazapina:

- dígame a su doctor y a su farmacéutico si usted es alérgico a la mirtazapina o a otros medicamentos.
- dígame a su doctor y a su farmacéutico qué medicamentos con y sin prescripción está tomando, especialmente diazepam (Valium) y vitaminas. No tome mirtazapina si usted está tomando inhibidores de MAO [fenelzina (Nardil) o tranilcipromina (Parnate)]; estos medicamentos deben suspenderse 14 días antes de comenzar a tomar mirtazapina.
- dígame a su doctor si tiene o alguna vez ha tenido un ataque cardíaco, presión arterial baja, trastornos del corazón o hígado, fenilcetonuria o colesterol alto.
- dígame a su doctor si está embarazada, tiene planes de quedar embarazada o si está amamantando. Si queda embarazada mientras toma este medicamento, llame a su doctor de inmediato.
- si va a ser sometido a cualquier cirugía, incluyendo la dental, dígame al doctor o dentista que usted está tomando mirtazapina.
- este medicamento puede provocar somnolencia (sueño). No conduzca automóviles ni maneje maquinaria pesada hasta que sepa cómo lo afectará este medicamento.
- el alcohol puede aumentar la somnolencia provocada por este medicamento.

¿Qué tengo que hacer si me olvido de tomar una dosis?

Tome la dosis que olvidó tan pronto como lo recuerde, sin embargo, si es hora para la siguiente, sátese aquella que no tomó y siga con la dosificación regular. No tome una dosis doble para compensar la que olvidó.

¿Cuáles son los efectos secundarios que podría provocar este medicamento?

Aunque los efectos secundarios de este medicamento no son comunes, podrían llegar a presentarse. Dígale a su doctor si cualquiera de estos síntomas se vuelve severo o si no desaparece:

- somnolencia (sueño)
- mareos
- ansiedad
- confusión
- aumento de peso y de apetito
- sensación de sequedad en la boca
- estreñimiento (constipación)
- malestar estomacal
- vómitos

Si usted experimenta alguno de los siguientes síntomas, llame a su doctor de inmediato:

- síntomas similares a los de la gripe, fiebre, escalofríos, dolor de garganta, heridas en la boca u otros signos de infección
- dolor en el tórax
- frecuencia cardíaca más rápida que lo normal
- crisis convulsivas

¿Cómo debo almacenar este medicamento?

Mantenga este medicamento en su envase, bien cerrado y fuera del alcance de los niños. Almacénelo a temperatura ambiente y lejos del calor excesivo y la humedad (no en el baño). Deseche cualquier medicamento que esté vencido o que ya no se utilice. Converse con su farmacéutico acerca del desecho adecuado de los medicamentos.

¿Qué debo hacer en caso de una sobredosis?

En caso de una sobredosis, llame a la oficina local de control de envenenamiento al 1-800-222-1222. Si la víctima está inconsciente, o no respira, llame inmediatamente al 911.

¿Qué otra información de importancia debería saber?

Cumpla con todas las citas con su doctor y el laboratorio. Su doctor podría ordenar algunos exámenes de laboratorio para determinar la respuesta de su cuerpo a la mirtazapina.

No deje que otras personas tomen su medicamento. Pregúntele al farmacéutico cualquier duda que tenga sobre cómo renovar la prescripción de su medicamento.

Documento actualizado - 01/04/2003



American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Cláusula de Protección -

<http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ashpdisclaimer.html>

Copyright, 2003, American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Todos los derechos reservados. Su duplicación para uso comercial deberá ser autorizada por ASHP. Traducido del inglés por GraciasDoctor, Inc.