

Medicinas: Risperidona

Dirección de esta página: <http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/druginfo/medmaster/a694015-es.html>

Nombre(s) comercial(es): Risperdal

¿Para cuáles condiciones o enfermedades se prescribe este medicamento?

La risperidona se usa para tratar los trastornos psicóticos y los síntomas como las alucinaciones, delusiones y la hostilidad.

Este medicamento también puede ser prescrito para otros usos; pídale más información a su doctor o farmacéutico.

¿Cómo se debe usar este medicamento?

La risperidona viene envasada en forma de tabletas para tomar por vía oral. Por lo general se toma dos veces al día (cada 12 horas). Siga cuidadosamente las instrucciones en la etiqueta del medicamento y pregúntele a su doctor o farmacéutico cualquier cosa que no entienda. Use el medicamento exactamente como se indica. No use más ni menos que la dosis indicada ni tampoco más seguido que lo prescrito por su doctor.

Siga tomando este medicamento aunque se sienta bien, y no descontinúe su uso sin antes conversar con su doctor, especialmente si usted ha tomado dosis grandes durante mucho tiempo. Su doctor probablemente reducirá la dosis en forma gradual. Este medicamento debe tomarse regularmente durante algunas semanas antes de que se sienta su efecto total.

¿Cuáles son las precauciones especiales que debo seguir?

Antes de comenzar a tomar risperidona:

- díglele a su doctor y a su farmacéutico si usted es alérgico a la risperidona o a otros medicamentos.
- díglele a su doctor y a su farmacéutico qué medicamentos con y sin prescripción está tomando, especialmente carbamazepina (Tegretol), clozapina (Clorazil), levodopa (Dopar, Sinemet), medicamentos para la hipertensión y vitaminas.
- díglele a su doctor si usted tiene o alguna vez ha tenido problemas al corazón, riñón o hígado; angina, frecuencia cardíaca irregular o problemas con la presión arterial; accidentes cerebrovasculares; crisis convulsivas; trastornos sanguíneos; depresión; o antecedentes de alcohol o abuso de drogas.
- díglele a su doctor si está embarazada, tiene planes de quedar embarazada o si está amamantando. Si queda embarazada mientras toma este medicamento, llame a su doctor de inmediato.
- si va a ser sometido a cualquier cirugía, incluyendo la dental, díglele al doctor o dentista que usted está tomando risperidona.
- este medicamento puede provocar somnolencia (darle sueño). No conduzca automóviles ni maneje maquinaria pesada hasta que sepa cómo lo afectará este medicamento.
- el alcohol puede aumentar la somnolencia provocada por este medicamento.
- evite la exposición innecesaria o prolongada a la luz solar y use ropa que cubra su piel, gafas de sol y filtro solar. Este medicamento hace que su piel se vuelva mucho más sensible a la luz solar.

¿Qué tengo que hacer si me olvido de tomar una dosis?

Tome la dosis que olvidó tan pronto como lo recuerde, sin embargo, si es hora para la siguiente, sátese aquella que no tomó y siga con la dosificación regular. No tome una dosis doble para compensar la que olvidó.

¿Cuáles son los efectos secundarios que podría provocar este medicamento?

La risperidona puede provocar efectos secundarios. Díglele a su doctor si cualquiera de estos síntomas se vuelve severo o si no desaparece:

- somnolencia (sueño)
- mareos
- náuseas
- malestar estomacal
- vómitos
- estreñimiento (constipación)
- agitación
- cefalea (dolor de cabeza)
- aumento de peso
- insomnio
- rinorrea

Si usted experimenta alguno de los siguientes síntomas, llame a su doctor de inmediato:

- temblores
- retorcimiento de la lengua
- movimientos inusuales de la cara, boca o mandíbula
- problemas para hablar
- dificultad para tragar
- tambaleo al caminar
- crisis convulsivas o convulsiones
- visión borrosa
- frecuencia cardíaca irregular
- fiebre
- sarpullido (erupciones en la piel)
- decoloración amarillenta de la piel u ojos

¿Cómo debo almacenar este medicamento?

Mantenga este medicamento en su envase, bien cerrado y fuera del alcance de los niños. Almacénelo a temperatura ambiente y lejos del calor excesivo y la humedad (no en el baño). Deseche cualquier medicamento que esté vencido o que ya no se utilice. Converse con su farmacéutico acerca del desecho adecuado de los medicamentos.

¿Qué debo hacer en caso de una sobredosis?

En caso de una sobredosis, llame a la oficina local de control de envenenamiento al 1-800-222-1222. Si la víctima está inconsciente, o no respira, llame inmediatamente al 911.

¿Qué otra información de importancia debería saber?

Cumpla con todas las citas con su doctor y el laboratorio. Su doctor podría ordenar algunos exámenes de laboratorio para determinar la respuesta de su cuerpo a la risperidona.

No deje que otras personas tomen su medicamento. Pregúntele al farmacéutico cualquier duda que tenga sobre cómo renovar la prescripción de su medicamento.

Documento actualizado - 01/04/2003



American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Cláusula de Protección -

<http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ashpdisclaimer.html>

Copyright, 2003, American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Todos los derechos reservados. Su duplicación para uso comercial deberá ser autorizada por ASHP. Traducido del inglés por GraciasDoctor, Inc.