

## Medicinas: Quetiapina

Dirección de esta página: <http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/druginfo/medmaster/a698019-es.html>

Nombre(s) comercial(es): Seroquel

### ¿Para cuáles condiciones o enfermedades se prescribe este medicamento?

La quetiapina se usa para tratar los trastornos y los síntomas psicóticos como las alucinaciones, delusiones y la hostilidad.

Este medicamento también puede ser prescrito para otros usos; pídale más información a su doctor o farmacéutico.

### ¿Cómo se debe usar este medicamento?

La quetiapina viene envasada en forma de tabletas para tomar por vía oral. Se toma por lo general dos o tres veces al día. Siga cuidadosamente las instrucciones en la etiqueta del medicamento y pregúntele a su doctor o farmacéutico cualquier cosa que no entienda. Use el medicamento exactamente como se indica. No use más ni menos que la dosis indicada ni tampoco más seguido que lo prescrito por su doctor.

La quetiapina controla los síntomas de un trastorno psicótico, pero no los cura. Continúe con el medicamento aunque se sienta mejor y no deje de tomarlo sin antes consultarlo con su médico. Su doctor probablemente reducirá su dosis de manera gradual.

### ¿Cuáles son las precauciones especiales que debo seguir?

Antes de comenzar a tomar quetiapina:

- díglele a su doctor y a su farmacéutico si usted es alérgico a la quetiapina o a otros medicamentos.
- díglele a su doctor y a su farmacéutico qué medicamentos con y sin prescripción está tomando, especialmente amantadina (Symadine, Symmetrel), barbitúricos, bromocriptina (Parlodel), carbamazepina (Tegretol), cimetidina (Tagamet, Tagamet HB), eritromicina, fluconazol (Diflucan), glucocorticoides (cortisona, hidrocortisona, prednisona, prednisolona, dexametasona), itraconazol (Sporanox), ketoconazol (Nizoral), levodopa (Larodopa, Dopar, Sinemet), lorazepam (Ativan), medicamentos para la hipertensión, pergolida (Permax), fenobarbital (Luminal), fenitoína (Dilantin), pramipexol (Mirapex), rifampicina (Rifadin, Rimactane), selegilina (Eldepryl), tioridazina (Mellaril) y vitaminas.
- díglele a su doctor si tiene o alguna vez ha tenido enfermedad de Alzheimer, crisis convulsivas, o problemas al corazón o al hígado.
- díglele a su doctor si está embarazada, tiene planes de quedar embarazada o si está amamantando. Si queda embarazada mientras toma este medicamento, llame a su doctor de inmediato.
- si va a ser sometido a cualquier cirugía, incluyendo la dental, díglele al doctor o dentista que usted está tomando quetiapina.
- este medicamento puede provocar somnolencia (sueño). No conduzca automóviles ni maneje maquinaria pesada hasta que sepa cómo lo afectará este medicamento.
- el alcohol puede aumentar la somnolencia provocada por este medicamento.
- evite actividades que hacen que aumente la temperatura de su cuerpo o que se deshidrate.
- levántese lentamente después de haber estado sentado o acostado, de lo contrario podría sentirse mareado o débil.

### ¿Qué tengo que hacer si me olvido de tomar una dosis?

Tome la dosis que olvidó tan pronto como lo recuerde, sin embargo, si es hora para la siguiente, sátese aquella que no tomó y siga con la dosificación regular. No tome una dosis doble para compensar la que olvidó.

### ¿Cuáles son los efectos secundarios que podría provocar este medicamento?

Aunque los efectos secundarios de este medicamento no son comunes, podrían llegar a presentarse. Dígale a su doctor si cualquiera de estos síntomas se vuelve severo o si no desaparece:

- mareos
- náuseas
- sensación de sequedad en la boca
- estreñimiento (constipación)
- malestar estomacal
- dolor de estómago
- cefalea (dolor de cabeza)
- cansancio
- aumento de peso excesivo
- rinorrea
- sarpullido (erupciones en la piel)
- dolor de oídos
- síntomas similares a los de la gripe
- inflamación en los tobillos
- visión borrosa

Si usted experimenta alguno de los siguientes síntomas, llame a su doctor de inmediato:

- desmayos
- crisis convulsivas
- aumento de la temperatura corporal (fiebre), contracciones musculares, dificultad para pensar claramente, frecuencia cardíaca irregular
- espasmos musculares, retorcimiento de la lengua, temblores, tambaleo al caminar, incapacidad para mantenerse sentado, movimientos entrecortados

### **¿Cómo debo almacenar este medicamento?**

Mantenga este medicamento en su envase, bien cerrado y fuera del alcance de los niños. Almacénelo a temperatura ambiente y lejos del calor excesivo y la humedad (no en el baño). Deseche cualquier medicamento que esté vencido o que ya no se utilice. Converse con su farmacéutico acerca del desecho adecuado de los medicamentos.

### **¿Qué debo hacer en caso de una sobredosis?**

En caso de una sobredosis, llame a la oficina local de control de envenenamiento al 1-800-222-1222. Si la víctima está inconsciente, o no respira, llame inmediatamente al 911.

### **¿Qué otra información de importancia debería saber?**

Cumpla con todas las citas con su doctor y el laboratorio. Su doctor podría ordenar algunos exámenes de laboratorio para determinar la respuesta de su cuerpo a la quetiapina. No deje que otras personas tomen su medicamento. Pregúntele al farmacéutico cualquier duda que tenga sobre cómo renovar la prescripción de su medicamento.

Documento actualizado - 01/04/2003



American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Cláusula de Protección -

<http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ashpdisclaimer.html>

Copyright, 2003, American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Todos los derechos reservados. Su duplicación para uso comercial deberá ser autorizada por ASHP. Traducido del inglés por GraciasDoctor, Inc.