

carbamazepine (oral)

Carbatrol, Epitol, Tegretol, Tegretol XR

¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre carbamazepine?



En raras ocasiones, la carbamazepine puede causar problemas sanguíneos graves. Avise a su doctor de inmediato si contrae cualesquiera de los siguientes síntomas, que pudieran ser signos de posibles problemas sanguíneos: fiebre, dolor de garganta, irritación, llagas en la boca, facilidad para infligir magulladuras, o contusiones coloradas o moradas.



No deje de tomar carbamazepine, aún cuando se sienta mejor. Es importante seguir tomando carbamazepine para prevenir que vuelvan a ocurrir convulsiones.



Tenga precaución al manejar, operar maquinaria o al realizar otras actividades peligrosas. La carbamazepine puede causar mareo o somnolencia. Si siente somnolencia o mareos, evite realizar tales actividades.



No tome alcohol mientras toma carbamazepine. El alcohol puede aumentar la somnolencia causada por la carbamazepine. Puede también aumentar el riesgo de sufrir ataques apopléticos.



La carbamazepine puede disminuir el efecto de las pastillas anticonceptivas. Para evitar un embarazo inesperado, use un segundo método de control de natalidad mientras toma carbamazepine.

¿Qué es carbamazepine?

La carbamazepine es una droga que los nervios y el cerebro. Esta trabaja reduciendo los impulsos nerviosos que causan las convulsiones y el dolor.

La carbamazepine se usa para tratar los ataques epilépticos y el dolor, tal como la neuralgia trigeminal y la neuropatía diabética.

La carbamazepine puede usarse también para fines distintos a los que se señalan en esta guía de medicamentos.

¿Quién no debe tomar carbamazepine?



No tome carbamazepine sin antes consultar antes a su doctor si

- alguna vez ha sufrido una reacción alérgica a los antidepresivos tricíclicos, tales como amitriptilina (Elavil), clomipramina (Anafranil), doxepina (Sinequan), desipramina (Norpramin), amoxapina (Ascendin), imipramina (Tofranil) o nortriptilina (Pamelor);
- ha tomado un inhibidor de monoamina oxidasa (MAOI, por sus siglas en inglés), tal como isocarboxazida (Marplan), fenelzina (Nardil), tranilcipromina (Parnate) en las últimas 14 semanas; o
- tiene una enfermedad en la médula espinal o una historia de supresión en la médula espinal.

Antes de tomar carbamazepine, dígame a su doctor si tiene :

- una enfermedad en el riñón;
- una enfermedad en el hígado;
- enfermedad del corazón;
- un nivel bajo de glóbulos rojos en su cuerpo (anemia); o
- glaucoma.

No podrá tomar carbamazepine, o tal vez requiera un dosis más baja o un control especial durante el tratamiento si usted tiene cualquiera de las condiciones mencionadas arriba.

La carbamazepine se encuentra clasificado en la categoría D de la FDA. Esto significa que se sabe que la carbamazepine perjudica a un bebé nonato. **No** tome este medicamento sin consultar antes a su doctor si se encuentra embarazada.

La carbamazepine se infiltra a través de la leche materna y puede perjudicar a un bebé lactante. **No** tome este medicamento sin consultar antes a su doctor si está amamantando a un bebé.

carbamazepine (oral)

¿Cómo debo tomar carbamazepine?

Tome carbamazepine exactamente como se lo indique su doctor. Si no entiende estas instrucciones, pregunte a su farmacéutico, enfermera o médico para que le expliquen.

Tome cada dosis con un vaso de agua lleno.

Las marcas de carbamazepine Tegretol, Tegretol XR y Eptol deben tomarse con alimentos. La marca de carbamazepine Carbatrol puede tomarse con o sin alimentos.

No triture, mastique o rompa las fórmulas de liberación prolongada (Tegretol XR) de carbamazepine. Tráguelas completas. Estas han sido formuladas especialmente para liberarse lentamente en su cuerpo.

Si le cuesta tragar las cápsulas de Carbatrol, las podrá abrir y esparcir su contenido sobre una cucharilla con alimentos suaves, tales como la compota de manzana u otros alimentos similares. Trague todo el contenido en la cucharilla, asegurándose de no masticar o triturar las partículas pequeñas. Consuma la mezcla inmediatamente, no la guarde para el futuro. Beba un vaso de agua de 8 onzas después de tragar la mezcla.

Su cuerpo no puede absorber la capita que reviste a la pastilla de Tegretol XR y es posible verla presente en las heces.

Bata la suspensión de carbamazepine mucho antes de comenzar a medir la dosis. Para asegurarse de tomar la dosis correcta, mida la suspensión con una cucharilla o una taza de medición de dosis especial, no use una cuchara sopera corriente. Si no tiene un dispositivo para medir dosis, pregunte a su farmacéutico dónde puede conseguir uno.

No mezcle la suspensión de Tegretol con otras medicinas líquidas o la tome a la vez que toma otras medicinas líquidas, a menos que sea bajo las instrucciones de su doctor. Hacer eso puede ocasionar la formación de un precipitado (materia sólida).

Su doctor puede pedirle que se haga a un examen de sangre durante su terapia con carbamazepine. Es importante que su doctor sepa la cantidad de carbamazepine que hay presente en su sangre y lo bien funciona su hígado.

Póngase o lleve un medallón de identificación médica para que los demás sepan que usted está tomando este medicamento en caso de ocurrir una emergencia.

No deje de tomar carbamazepine, aún cuando se sienta mejor. Es importante seguir tomando carbamazepine para prevenir que los ataques epilépticos vuelvan a ocurrir.

La toronja y el jugo de toronja pueden actuar en reciprocidad con la carbamazepine. La interacción puede llegar a causar un efecto muy peligroso. Deberá hablar con su doctor acerca del consumo de toronja y el jugo de toronja. No aumente o disminuya el consumo de productos a base de toronja en su dieta sin consultar antes a su doctor.

Guarde la carbamazepine a temperatura ambiente, lejos de la humedad y el calor.

¿Qué ocurre si omito una dosis?

Tome la dosis que omitió tan pronto se acuerde. No obstante, si es casi la hora de la próxima dosis, no tome la dosis que omitió y tome únicamente la siguiente dosis normal. **No** tome una doble dosis de este medicamento.

¿Qué sucede si ocurre una sobredosis?

Busque atención médica de emergencia.

Los síntomas de una sobredosis de carbamazepine incluyen un descenso en el ritmo respiratorio o una respiración irregular, espasmos musculares, cansancio, ataques epilépticos, temblores, pronunciación indistinta, andar tambaleando, mareo, pupilas dilatadas, movimiento repetitivo de los ojos, náusea, vómito y disminución en la producción de orina.

¿Qué debo evitar al tomar carbamazepine?

Tenga precaución al manejar, operar maquinaria o al realizar otras actividades peligrosas. La carbamazepine puede causar mareo o somnolencia. Si siente somnolencia o mareos, evite realizar tales actividades.

carbamazepine (oral)

No tome alcohol mientras toma carbamazepine. El alcohol puede aumentar la somnolencia causada por la carbamazepine. Puede también aumentar el riesgo de sufrir ataques apopléticos.

Evite la exposición prolongada a la luz solar. La carbamazepine puede incrementar la sensibilidad de la piel a la luz solar. Use una crema con protección solar y vístase con ropa protectora si la exposición al sol es inevitable.

La toronja y el jugo de toronja pueden actuar en reciprocidad con la carbamazepine. La interacción puede llegar a causar un efecto muy peligroso. Deberá hablar con su doctor acerca del consumo de toronja y el jugo de toronja. No aumente o disminuya el consumo de productos a base de toronja en su dieta sin consultar antes a su doctor.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de la carbamazepine?

Si siente cualquiera de los siguientes efectos secundarios graves, busque atención médica de emergencia o avise a su doctor de inmediato:

- una reacción alérgica (dificultad al respirar, estrechamiento de la garganta; hinchazón de los labios, la lengua o la cara; o urticaria);
- una lesión en el hígado (color amarillento de la piel o los ojos, náusea, dolor o malestar abdominal, fatiga severa);
- dolor en el pecho, presión arterial elevada (dolor de cabeza, sonrojo) o insuficiencia cardíaca por congestión venosa (insuficiencia respiratoria, hinchazón de los tobillos);
- hormigueo o entumecimiento en las manos, pies, brazos o en las piernas;
- espasmos corporales o musculares;
- confusión, pronunciación indistinta o desmayo;
- dolores de cabeza continuos, alucinaciones o depresión;
- náusea o vómito severo;
- movimientos repetitivos de los ojos;
- visión borrosa o doble; o
- menor producción de orina;

En raras ocasiones, la carbamazepine puede causar problemas sanguíneos graves. Avise a su doctor de inmediato si contrae cualesquiera de los siguientes síntomas, que pudieran ser signos de posibles problemas

sanguíneos: fiebre, dolor de garganta, irritación, llagas en la boca, facilidad para infligir magulladuras, o contusiones coloradas o moradas.

Es probable que otros efectos secundarios de menor gravedad ocurran. Siga tomando carbamazepine y llame a su doctor si siente

- una ligera náusea, vómito, diarrea o constipación o pérdida de apetito;
- resequedad en la boca;
- impotencia; o
- dolores en las articulaciones o en los músculos.

Pueden ocurrir también otros efectos secundarios que no se hayan señalado aquí. Hable con su doctor acerca de cualquier efecto secundario que parezca inusual o que en especial le preocupe.

¿Qué otras drogas pueden afectar a la carbamazepine?

La carbamazepine puede disminuir el efecto de las pastillas anticonceptivas. Para evitar un embarazo inesperado, use un segundo método de control de natalidad mientras toma carbamazepine.

La carbamazepine puede interactuar con muchas otras medicinas y muchas de ellas pueden afectar su condición. No tome otras medicinas prescritas o no prescritas o productos herbales sin consultarlo antes a su doctor o farmacéutico.

¿Dónde puedo obtener más información?

Su farmacéutico tiene más información impresa para los profesionales de la salud sobre carbamazepine que usted puede leer.

Recuerde, mantenga éste y todos los otros medicamentos fuera del alcance de los niños, no comparta nunca sus medicamentos con otros y tome este medicamento únicamente según la receta indicada.

La finalidad de la información contenida en este folleto no es cubrir todos los usos, indicaciones, precauciones, interacciones, o efectos adversos posibles. Si usted tiene preguntas acerca de los medicamentos que está tomando, consulte a su médico, enfermera, o farmacéutico.