

# oxcarbazepine

Trileptal

## ¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre este fármaco?

No deje de tomar este medicamento, aún cuando se sienta mejor. Es importante seguir tomando oxcarbazepine para prevenir que los ataques epilépticos vuelvan a ocurrir.

La oxcarbazepine puede disminuir el efecto de las pastillas anticonceptivas. Use un segundo método anticonceptivo al tomar oxcarbazepine para asegurarse de estar protegida contra un posible embarazo no planeado.

No tome alcohol mientras toma este medicamento. El alcohol puede causar una sedación intensa o somnolencia. Puede también aumentar el riesgo de sufrir ataques apopléticos.

Tenga precaución al manejar, operar maquinaria o al realizar otras actividades peligrosas. La oxcarbazepine puede causar mareo o somnolencia. Si siente somnolencia o mareos, evite realizar tales actividades.

## ¿Qué es oxcarbazepine?

La oxcarbazepine es una droga que afecta sus nervios y su cerebro. Trabaja reduciendo los impulsos en los nervios que causan ataques epilépticos.

La oxcarbazepine se usa independientemente y con otras drogas para tratar ataques epilépticos.

La oxcarbazepine puede usarse también para fines distintos a los que se señalan en esta guía de medicamentos.

## ¿Quién no debe tomar oxcarbazepine?

No tome oxcarbazepine sin consultar antes a su doctor si alguna vez ha tenido una reacción alérgica a la oxcarbazepine (Tegreto, otros). Puede sufrir una reacción alérgica al tomar oxcarbazepine.

- Antes de tomar este medicamento, dígame a su doctor si usted tiene

- enfermedad renal, o
- enfermedad del hígado.

Es probable que no pueda tomar oxcarbazepine, o tal vez requiera un dosis más baja o un control especial durante el tratamiento si tiene cualquiera de las condiciones mencionadas arriba.

La oxcarbazepine se encuentra en la categoría C bajo el encabezado Embarazo de la FDA. Esto significa que no se sabe si la oxcarbazepine lesionará a un bebé nonato. **No** tome este medicamento sin antes consultar primero con su doctor si se encuentra embarazada.

La oxcarbazepine se infiltra a través de la leche materna y puede lesionar a un bebé lactante. **No** tome este medicamento sin antes consultar a su doctor si está amamantando a un bebé.

Si usted tiene más de 60 años de edad, es más probable que sienta efectos secundarios al tomar oxcarbazepine. Su doctor puede prescribirle una dosis más baja o un control especial durante su tratamiento.

La oxcarbazepine no ha sido aprobado para uso en niños menores de 4 años de edad.

## ¿Cómo debo tomar oxcarbazepine?

Tome oxcarbazepine exactamente como se lo prescriba su doctor. Si usted no entiende estas instrucciones, pregunte a su farmacéutico, enfermera o médico para que ellos le expliquen.

Tome cada dosis con un vaso de agua lleno.

Se puede tomar oxcarbazepine con o sin comida.

Es probable que su doctor le pida someterse a pruebas de sangre durante su terapia. Es importante que su doctor sepa la cantidad de oxcarbazepine que hay presente en su sangre y cuán bien funciona su hígado.

# oxcarbazepine

Póngase o lleve un medallón de identificación médica para que los demás sepan que usted está tomando este medicamento en caso de ocurrir una emergencia.

No deje de tomar este medicamento, aún cuando se sienta mejor. Es importante seguir tomando oxcarbazepine para prevenir que los ataques epilépticos vuelvan a ocurrir.

Guarde el itraconazole a temperatura ambiente, lejos de la humedad y el calor.

## ¿Qué ocurre si me salto una dosis?

Tome la dosis que se saltó tan pronto se acuerde. No obstante, si es casi la hora de tomar su próxima dosis, no tome la dosis que se saltó y tome la siguiente dosis normalmente programada. **No** tome una doble dosis de este medicamento.

## ¿Qué sucede si ocurre una sobredosis?

Busque atención médica de emergencia.

No se conocen los síntomas de una sobredosis de oxcarbazepine.

## ¿Qué debo evitar al tomar oxcarbazepine?

No tome alcohol mientras toma este medicamento. El alcohol puede causar una sedación intensa o somnolencia. Puede también aumentar el riesgo de sufrir ataques apopléticos.

Tenga precaución al manejar, operar maquinaria o al realizar otras actividades peligrosas. La oxcarbazepine puede causar mareo o somnolencia. Si siente somnolencia o mareos, evite realizar tales actividades.

## ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de la oxcarbazepine?

Si siente cualquiera de los siguientes efectos secundarios graves, busque atención médica de emergencia o avise a su doctor de inmediato:

- una reacción alérgica (dificultad al respirar, estrechamiento de la garganta; hinchazón de los labios, la lengua o la cara; o urticaria);
- síntomas de bajo nivel de sodio en la sangre (náusea, malestar general, dolor de cabeza, somnolencia extrema o confusión);
- efectos en el sistema nervioso central (dificultad para concentrarse, en el habla o el idioma; ganas excesivas de dormir o fatiga; pérdida de la coordinación o problemas para caminar); o
- visión doble, ataxia ocular (movimientos oscilatorios de los ojos), visión borrosa u otros tipos de problemas visuales.

Es probable que otros efectos secundarios de menor gravedad ocurran. Siga tomando oxcarbazepine y llame a su doctor si siente

- dolor de cabeza;
- una ligera somnolencia o fatiga;
- náusea, vómito o dolor estomacal;
- temblor,
- mareo;
- erupción;
- diarrea, constipación o pérdida del apetito;
- aumento de peso; o
- resequedad en la boca.

Pueden ocurrir también otros efectos secundarios que no se hayan señalado aquí. Hable con su doctor acerca de cualquier efecto secundario que parezca inusual o que especialmente le preocupe.

## ¿Qué otros fármacos pueden afectar a la oxcarbazepine?

Antes de tomar oxcarbazepine, dígame a su doctor si usted está tomando cualquiera de las drogas siguientes:

- carbamazepina (Tegretol, Epitol, Carbatrol, otros);
- fenobarbital (Solfoton, Luminal, otros);
- fenitoína (Dilantin, otros);
- ácido valproico (Depakene, Depacon, otros);
- lamotrigina (Lamictal);
- felodipina (Plendil); o

# oxcarbazepine

verapamil (Verelan, Calan, Isoptin, Covera-HS, otros).

No podrá tomar oxcarbazepine, o tal vez requiera una dosis más baja o un control especial durante el tratamiento si está tomando cualquiera de las medicinas señaladas arriba.

La oxcarbazepine puede disminuir el efecto de las pastillas anticonceptivas. Use un segundo método anticonceptivo al tomar oxcarbazepine para asegurarse de estar protegida contra un posible embarazo no planeado.

Los fármacos que no sean los señalados aquí pueden también actuar en reciprocidad con la oxcarbazepine o empeorar su condición. Hable con doctor y farmacéutico antes de tomar cualquier prescripción o medicamentos no prescritos.

## ¿Dónde puedo obtener más información?

Su farmacéutico tiene más información impresa para los profesionales de la salud sobre oxcarbazepine que usted puede leer.

---

Recuerde, mantenga éste y todos los otros medicamentos fuera del alcance de los niños, no comparta nunca sus medicamentos con otros y tome este medicamento únicamente según la receta indicada.

La finalidad de la información contenida en este folleto no es cubrir todos los usos, indicaciones, precauciones, interacciones, o efectos adversos posibles. Si usted tiene preguntas acerca de los medicamentos que está tomando, consulte a su médico, enfermera, o farmacéutico.

© 1996-2000 Multum Information Services Inc. Versión: 1.01. Revisado: 11/21/00.